

# Document 15 **swissnosc** SSI-module


## Catégorisation et schéma des interventions sur le côlon et le rectum les plus fréquentes

Version 01.10.2018

**Ce document présente les principales interventions chirurgicales sur le côlon et le rectum.** Il sert d'aide à la décision pour classer les interventions dans les catégories « chirurgie du côlon, code 6 » et « opérations du rectum, code 281 » dans le système de surveillance Swissnoso. D'un point de vue chirurgical, son contenu est volontairement simplifié.







Le tableau des pages 2 à 5 présente la localisation de la pathologie colique ou rectale, explique le type de résection et d'anastomose (si présente) à l'aide de schémas simples, et cite les codes de la Classification Suisse des Interventions Chirurgicales<sup>1</sup> (CHOP, version 2018) de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pour rappel, les opérations comportent souvent plus d'un code CHOP, mais seul le code principal est présenté dans le tableau.

### Rappel anatomique






<sup>1</sup> Office fédéral de la statistique (OFS). Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP). Index systématique – Version 2018- Neuchâtel 2017  
Version\_01.10.2018

# Document 15 **swissnosc** SSI-module

Localisation		Résection / anastomose		Codes CHOP 2018 et procédures				
Tumeur ou autre pathologie <sup>2</sup> du côlon droit		Réalisation d'une hémicolectomie droite et une anastomose entre l'intestin grêle (iléon) et la partie transverse du côlon		45.73.--	Hémicolectomie droite, colectomie droite radicale, iléocoliectomie	Côlon 6		
				45.72.--	Résection iléo-caecale: résection du caecum et iléon terminal, résection du caecum			
Tumeur ou autre pathologie <sup>2</sup> du côlon gauche		Réalisation d'une hémicolectomie gauche (y compris sigmoïde) et d'une anastomose au niveau de la jonction colo-rectale		45.75.1-	Hémicolectomie gauche <b>sans</b> sigmoïdectomie: résection côlon ascendant et angle colique gauche	Côlon 6		
				45.75.2-	Hémicolectomie gauche <b>avec</b> sigmoïdectomie yc celle incluant la résection de parties intrapéritonéales du rectum			
Tumeur ou autre pathologie <sup>2</sup> du côlon transverse		1. Réalisation d'une résection du côlon droit et transverse si la tumeur est localisée plus à droite (résection étendue)		45.77.1-	Hémicolectomie droite étendue: résection du côlon transverse et du côlon ascendant	Côlon 6		
				ou	2. réalisation d'une résection du côlon gauche et transverse si la tumeur est localisée plus à gauche (résection étendue)	45.77.2-	Hémicolectomie gauche étendue: résection du côlon transverse et du côlon descendant	Côlon 6
				ou	3. dans des cas exceptionnels, résection du côlon transverse seul	45.74.-	Résection du côlon transverse, colectomie transverse	Côlon 6

<sup>2</sup> Autre pathologie telle que saignement, diverticule ou autre  
Version\_01.10.2018




# Document 15 **swissnosc** SSI-module

Localisation		Résection / anastomose	Codes CHOP 2018			
A. Diverticulose ou diverticulite du sigmoïde		La section proximale se fait sur un côlon souple non diverticulaire La sigmoïdectomie est totale et emporte la <b>jonction colo-rectale</b> . <b>Figure 1</b>	45.76-	Sigmoïdectomie y compris la résection de parties intrapéritonéales du rectum	Côlon 6	
		<b>A et B:</b> réalisation d'une sigmoïdectomie incluant la résection de parties intrapéritonéales du rectum ( <b>Figure 2</b> ) et d'une hémicolectomie gauche en cas de tumeur.  La section se situe au-dessus du repli péritonéal. <b>Figure 2</b> Selon la localisation de la tumeur, ceci peut impliquer une résection partielle d'au moins 5 cm du mésorectum. <b>Figure 3</b>				
B. Tumeur du sigmoïde		Réalisation d'une hémicolectomie gauche (y compris du sigmoïde) et d'une anastomose colo-rectale au niveau de la partie haute du rectum		45.76-	Résection de parties intrapéritonéales du rectum (voir note 1)	Rectum 281
				48.6-	Si résection des parties extrapéritonéales du rectum= rectum (voir note 1)	

## Plans anatomiques de la jonction colo-rectale.

- La jonction est repérée en avant du rectum par la fin du tænia antérieur (1) et en arrière par la première branche collatérale des vaisseaux rectaux supérieurs (2)
- La section distale du sigmoïde est réalisée **sous la jonction colo-rectale (3) au-dessus du repli péritonéal**
- L'anastomose est effectuée entre la partie haute du rectum et la partie proximale du côlon

Figure 1



**Note 1 :** la version 2018 de la Classification Suisse des Interventions chirurgicales utilise la relation anatomique du rectum avec le péritoine pour différencier la chirurgie du côlon de celle du rectum en cas de sigmoïdectomie avec:

- Résection des parties intrapéritonéales du rectum (en dessus du repli péritonéal) = 45.76 = côlon (6)
- Résection des parties extrapéritonéales du rectum (en dessous du repli péritonéal) = rectosigmoïdectomie (48.6-) = rectum (281)

Lorsque le motif d'intervention est une diverticulose et/ou une diverticulite, celle-ci est classée comme un côlon (6)

Figure 2 : parties intra-péritonéales du rectum









Figure 3 : mésorectum et cul de sac péritonéal



# Document 15 **swissnosc** SSI-module

Localisation		Résection / anastomose	Codes CHOP 2018		
<b>A. Tumeur du haut rectum (&gt;12-16 cm de la marge anale<sup>3</sup>)</b>  <b>B. Tumeur du moyen rectum (&gt;6-12 cm de la marge anale<sup>3</sup>)</b>	<b>Rappel anatomique</b> Plis transverses du rectum  Repli péritonéal supérieur >12 cm, A median >6 <12 cm, B inférieur <6 cm, C  <b>Localisation de la tumeur</b> 	<b>A. Haut rectum= tiers supérieur:</b> >12-16 cm de la marge anale = résection antérieure du rectum par voie abdominale	<b>48.66.2-</b> Résection antérieure du rectum. <b>48.66.21</b> Résection antérieure du rectum avec anastomose <b>48.66.22</b> Résection antérieure du rectum avec entérostomie du bout distal <b>48.66.25</b> Résection antérieure du rectum, transanal	<b>Rectum 281</b>	
		<b>B. Moyen rectum=tiers median:</b> >6-<12 cm de la marge anale = résection antérieure profonde du rectum (résection antérieure basse) et exérèse du mésorectum par voie abdominale	<b>48.66.3-</b> Résection antérieure profonde du rectum <b>48.66.31</b> Résection antérieure profonde du rectum avec anastomose <b>48.66.32</b> Résection antérieure profonde du rectum avec entérostomie du bout distal <b>48.66.35</b> Résection antérieure profonde du rectum, transanal		
		<b>Rétablissement de la continuité</b> par anastomose <b>digestive basse</b> colorectale mécanique ou manuelle et souvent <b>iléostomie</b> dont le but initial est provisoire (de décharge) :	Anastomose colo-rectale basse 	Iléostomie latérale ou colostomie terminale 	

**Note 2 :** la version 2018 de la Classification Suisse des Interventions chirurgicales différencie les résections antérieures du rectum dont la hauteur de la résection est en-dessous du repli péritonéal en deux catégories :






- Résection antérieure du rectum (A)
- Résections antérieures profondes du rectum (B).

Pour la résection antérieure profonde du rectum vaut en plus le critère de la présence d'une néoplasie maligne avec une hauteur du bord aboral de la tumeur ≤12 cm de la marge anale (ligne ano-cutanée)

Pour ces 2 catégories, la hauteur de la résection est située en-dessous du repli péritonéal = rectum (281). **Figure 2**

<sup>3</sup> La distinction entre le haut, moyen et bas rectum à partir de la marge anale est une définition valable. Du point de vue de la technique chirurgicale elle-même, le chirurgien se base également sur la réflexion péritonéale (cul-de-sac de Douglas) pour distinguer la localisation d'une tumeur en dessous ou en dessus de celle-ci

# Document 15 **swissnosc** SSI-module

Localisation	Résection / anastomose / entérostomie	Codes CHOP_2018				
<p><b>C. Tumeur du bas rectum (0 – &lt;6 cm de la marge anale<sup>4</sup>)</b></p>  	<p><b>Selon la localisation de la tumeur du bas du rectum, la résection s'effectue sans (C1) ou avec (C2) conservation du sphincter</b></p> <p><b>C1. Résection du rectum sans conservation du sphincter</b></p> <p>→ Si le sphincter anal externe est atteint : <b>amputation abdomino-périnéale</b> suivie d'un anus « artificiel » définitif situé à Gauche</p> <p><b>C2. Résection avec conservation du sphincter</b></p> <p>→ Résection antérieure très basse (colo-anale) conventionnelle (<b>RATB</b>)</p> <p>→ <b>Résection intersphinctérienne (RIS)</b> pour les tumeurs situées à moins de 1-2 cm du sphincter anal</p>	<b>48.5-</b>	Résection du rectum sans conservation du sphincter	<b>Rectum 281</b>		
		<b>48.51</b>	Résection abdomino-périnéale du rectum			
		<b>48.53</b>	Résection abdomino-sacrale, sacro-périnéale et périnéale du rectum			
				<b>48.59</b>	Autre résection sans conservation du sphincter	<b>Rectum 281</b>
			Amputation abdomino-périnéale AAP		Colostomie terminale définitive	
			Amputation combinée synchrone ACS			
		<b>48.66-</b>	Résection du rectum avec conservation du sphincter	<b>Rectum 281</b>		
		<b>48.66.1-</b>	Résection en manchette et résection tubulaire du rectum			
		<b>48.65</b>	Résection du rectum selon Duhamel			
			Anastomose colo-anale très basse	Mécanique	Manuelle	<b>Rectum 281</b>
						
<p><b>1. Amputation abdomino-périnéale (AAP) :</b> résection par <b>voie abdominale</b> du bas sigmoïde, du rectum pelvien avec le mésorectum et par <b>voie périnéale</b> du canal anal, de l'appareil sphinctérien, d'une partie des releveurs de l'anus et de la peau péri-anale. La colostomie est définitive. L'amputation est réservée au patient dont la fonction sphinctérienne est mauvaise, respectivement lorsque la tumeur infiltre les sphincters en particulier le sphincter externe</p> <p><b>2. Résection antérieure très basse (RATB) :</b> résection avec préservation des sphincters suivie d'une anastomose colo-anale mécanique ou manuelle protégée par une iléostomie. La préservation sphinctérienne se fait techniquement par une anastomose colo-anale</p> <p><b>3. Résection intersphinctérienne (RIS)</b> inclut une résection du sphincter anal interne</p>						

<sup>4</sup> La distinction entre le haut, moyen et bas rectum à partir de la marge anale est une définition valable. Du point de vue de la technique chirurgicale elle-même, le chirurgien se base également sur la réflexion péritonéale (cul-de-sac de Douglas) pour distinguer la localisation d'une tumeur en dessous ou en dessus de celle-ci