

Screening et surveillance active - Dépistage pour les bactéries multirésistantes (BMR)

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire!

Les abréviations suivantes sont utilisées:

MRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méthicilline
VRE	Entérocoque résistant à la vancomycine
ESBL	Entérobactéries productrices de beta-lactamase à spectre étendu
CPE	Entérobactéries productrices de carbapénémase
BMR	Bactéries multirésistantes
SI	Soins intensifs

* 1. Veuillez indiquer votre code de l'hôpital (par ex. AA00):

* 2. Il existe dans votre institution une norme écrite pour le dépistage des bactéries multirésistantes (BMR) chez les patients.

- Oui
 Non
 Je ne sais pas.

* 3. Les recommandations écrites préconisent un dépistage à l'admission en cas de transfert direct d'un patient depuis un hôpital à l'étranger avec séjour aux soins intensifs.

Veuillez cocher tous les agents pathogènes concernés et, le cas échéant, indiquer également si un autre agent est recherché.

- MRSA
 VRE
 ESBL
 Enterobactéries productrices de carbapénémases (CPE)
 Autre bactéries Gram négatif productrices de carbapénémases (p. ex. Acinetobacter, Pseudomonas)
 Candida auris
 Non, il n'y a pas de recommandation de dépistage.

Autres (texte libre)

* 4. Les recommandations écrites préconisent un dépistage à l'admission en cas de transfert direct d'un patient depuis un hôpital à l'étranger sans séjour aux soins intensifs.

Veillez cocher tous les agents pathogènes concernés et, le cas échéant, indiquer également si un autre agent est recherché.

- MRSA
- VRE
- ESBL
- Enterobactéries productrices de carbapénémases (CPE)
- Autre bactéries Gram négatif productrices de carbapénémases (p. ex. Acinetobacter, Pseudomonas)
- Candida auris*
- Non, il n'y a pas de recommandation de dépistage.

Autres (texte libre)

* 5. Les recommandations préconisent un dépistage à l'admission pour les patients ayant été hospitalisés (> 24h) à l'étranger au cours des 12 derniers mois.

Veillez cocher tous les agents pathogènes concernés et, le cas échéant, indiquer également si un autre agent est recherché.

- MRSA
- VRE
- ESBL
- Enterobactéries productrices de carbapénémases (CPE)
- Autre bactéries Gram négatif productrices de carbapénémases (p. ex. Acinetobacter, Pseudomonas)
- Candida auris*
- Non, il n'y a pas de recommandation de dépistage.

Autres (texte libre)

* 6. Les recommandations préconisent un dépistage à l'admission en cas de transfert d'un patient en provenance d'un autre hôpital de soins aigus en Suisse avec une flambée connue.

Veillez cocher tous les agents pathogènes concernés et, le cas échéant, indiquer également si un autre agent est recherché.

- MRSA
- VRE
- ESBL
- Enterobactéries productrices de carbapénémases (CPE)
- Autre bactéries Gram négatif productrices de carbapénémases (p. ex. Acinetobacter, Pseudomonas)
- Candida auris*
- Non, il n'y a pas de recommandation de dépistage.

Autres (texte libre)

* 7. Les recommandations préconisent un dépistage à l'admission lors du transfert d'un patient en provenance d'un service à haut risque* d'un hôpital en Suisse.

*Services à haut risque : p. ex. Soins intensifs, Néonatalogie (NICU), service de transplantation de cellules souches hématopoïétiques

Veillez cocher tous les agents pathogènes concernés et, le cas échéant, indiquer également si un autre agent est recherché.

- MRSA
- VRE
- ESBL
- Enterobactéries productrices de carbapénémases (CPE)
- Autre bactéries Gram négatif productrices de carbapénémases (p. ex. Acinetobacter, Pseudomonas)
- Candida auris*
- Non, il n'y a pas de recommandation de dépistage.

Autres (texte libre)

* 8. Dans notre institution, des dépistages transversaux (p. ex. Un dépistage de tous les patients d'une unité de soins en une journée) sont effectués pour certains pathogènes multirésistants.

Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent et, si nécessaire, ajouter un commentaire pour toute autre option.

- Oui, dans les services où les patients présentent un risque élevé de portage de BMR (p. ex., Soins intensifs, Néonatalogie (NICU), service de transplantation de cellules souches hématopoïétiques).
- Oui, dans les services où des flambées récurrentes ont eu lieu (même en l'absence d'une flambée actuellement active).
- Oui, dans les services avec une épidémie active dans le cadre de la gestion des épidémies.
- Non
- Je ne sais pas.

Autres (texte libre)

Copie- Remplir le questionnaire en ligne