

Raccomandazione di Swissnoso e della Società Svizzera di Anestesiologia e Medicina Perioperatoria (SSAPM): Tempistica degli interventi chirurgici durante/dopo COVID-19

V.2.0, 10.2.2022

Dal momento che l'evidenza disponibile non è del tutto chiara, il consenso informato con il paziente si rende necessario in tutti i casi.

Interventi di emergenza e urgenti: in qualsiasi momento dopo la discussione interdisciplinare e la valutazione del rischio.

Procedure elettive programmate in anestesia locale o regionale (RA)

- Almeno 48 ore dopo la fine dei sintomi clinici e almeno 10 giorni dopo il primo test positivo;
- Dopo decorsi gravi (= ospedalizzazione a seguito di Covid-19) e RA non funzionante (cioè conversione in anestesia generale necessaria) - si deve osservare l'interruzione / periodo di attesa AG (anestesia generale).

Procedure elettive in anestesia generale (AA)

- Dopo decorsi lievi / asintomatici: 48 ore dopo la fine dei sintomi clinici e almeno 10 giorni dopo il primo test positivo;
- Dopo decorsi gravi (= ricovero in ospedale a seguito di Covid-19), periodo di attesa di 7 settimane;
- Dopo un soggiorno in terapia intensiva a seguito di Covid-19 periodo di attesa di 3 mesi.