

## Vorsorgemassnahmen in Spitälern für einen Patienten mit Verdacht auf eine 2019-nCoV Infektion oder mit einer bestätigten 2019-nCoV Infektion

(Version 1.0, Swissnoso 31.1.2020)

Fragestellung	Massnahme	Optional
Bei Spitaleintritt	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Information Spitalhygiene</li> <li>– Patient zieht chirurgische Maske an bis er im Isolationszimmer ist</li> <li>– Information an Kantonsarzt innerhalb 2 Stunden</li> </ul>	
Isolationsmassnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontakt- und Aerosol Isolation (inkl. entsprechendes Türschild)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Negativ-Druck-Zimmer falls verfügbar</li> </ul>
Schutzmassnahmen für Personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schutzmaske FFP2, Überschürzen, Handschuhe,</li> <li>– Augenschutz/Schutzbrille bei Nasopharynx-Abstrichen oder während der medizinischen Behandlung (&lt;2 Meter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schutzmaske FFP3</li> <li>– Schutzbrille im Patientenzimmer</li> <li>– Zutrittsliste führen</li> </ul>
Schutzmassnahmen für Besucher	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Besuche nicht empfohlen (falls notwendig, gleiche Schutzmassnahmen wie Personal)</li> </ul>	
Bronchoskopie (erhöhtes Übertragungsrisiko)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Indikation in Absprache mit Pneumologie, Infektiologie, Spitalhygiene (Intensivmediziner, falls Patient auf der Intensivstation)</li> <li>– Starker Husten nach Bronchoskopie: Schutzbrille bei der Betreuung nach Bronchoskopie</li> </ul>	
Patientenbewegungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beschränkung auf notwendige Untersuchungen</li> <li>– Chirurgische Maske für Patienten ausserhalb des Patientenzimmers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schutzmaske FFP2 für Patienten</li> </ul>
Probenhandling (inkl. Labor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Respiratorische Proben sollen zu Fuss ins Labor gebracht werden</li> <li>– Gemäss Standard Massnahmen P2.</li> <li>– Für externen Versand, gemäss Standard B UN 3373</li> </ul>	
Umgebungsdekontamination	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tägliche Reinigung/Desinfektion und Schlusdesinfektion mit den üblichen anerkannten Desinfektionsmitteln</li> </ul>	
Wäsche, Instrumente, Geschirr, Abfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gemäss lokalen Richtlinien für Kontaktisolation</li> </ul>	
Aufhebung der Isolation	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verdacht nicht bestätigt oder</li> <li>– Gemäss Verordnung Spitalhygiene/Infektiologie</li> </ul>	