

Misure di Prevenzione negli ospedali per pazienti con infezione da 2019-nCoV sospetta o confermata

(Swissnoso 30.1.2020)

Domanda	Misure raccomandate	Opzionale
All' ammissione in ospedale	<ul style="list-style-type: none"> – Informare il servizio di prevenzione delle infezioni – Il paziente indossa una maschera chirurgica fino che non si trova in camera di isolamento 	
Misure di isolamento	<ul style="list-style-type: none"> – Precauzioni aggiuntive di tipo Contatto e aerosol (inclusa la stanza con anticamera) 	<ul style="list-style-type: none"> – Camera con pressione negativa se disponibile
Misure di protezione per il personale	<ul style="list-style-type: none"> – Maschera di protezione FFP2, sopra camice, guanti – Visiera/occhiali di protezione durante lo striscio nasofaringeo o durante le cure a distanza ravvicinata (<2m) 	<ul style="list-style-type: none"> – Maschera di protezione FFP3 – Registro degli accessi alla camera – Visiera/occhiali di protezione nella stanza del paziente
Misure di protezione per i visitatori	<ul style="list-style-type: none"> – Le visite di esterni non sono raccomandate – Se inevitabili valgono e stese precauzioni prese per il personale 	
Broncoscopia (rischio di trasmissione aumentato)	<ul style="list-style-type: none"> – Indicazione da discutere con il pneumologo, l'infettivologo e il servizio di prevenzione delle infezioni (e il medico intensivista qualora il paziente si trovi in cure intensive) – Attenzione: alla forte tosse che si presenta dopo la broncoscopia. Indossare sempre anche la visiera/occhiali di protezione durante le cure dopo l'esame. 	
Spostamenti del paziente	<ul style="list-style-type: none"> – Limitare al minimo indispensabile – Il paziente indossa la maschera chirurgica al di fuori della camera 	<ul style="list-style-type: none"> – Maschera di protezione FFP2 per il paziente
Manipolazione e presa in carico dei prelievi (incluso nel laboratorio)	<ul style="list-style-type: none"> – Misure standard tipo P2 – I prelievi respiratori devono essere portati in laboratorio di persona – Per le spedizioni esterne vale lo standard B UN 3373 	
Decontaminazione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> – Pulizia/disinfezione quotidiana e disinfezione a fine isolamento con i prodotti usuali 	
Biancheria, dispositivi medici, stoviglie, rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> – Secondo le linee guida locali in caso di isolamento da contatto. 	
Levata dell'isolamento	<ul style="list-style-type: none"> – Sospetto di 2019-nCoV non confermato (a meno che non sussistano altri motivi di isolamento) o – Dopo consulto con le malattie infettive e/o servizio di prevenzione delle infezioni. 	