Neu Pg 24449
Swiss - NOSO

Nosokomiale Infektionen und Spitalhygiene: aktuelle Aspekte

Band 1

0034-51260/35
17/4,95

Bulletin des Monats September 1994

Die Bekämpfung der nosokomialen Infektionen: nicht nur eine Aufgabe für den Spezialisten

Die Redaktionskommission (siehe Seite 8)

Einleitung

Jede medizinische Handlung beinhaltet ein Komplikationsrisiko. Unter diesen Komplikationen gehören die nosokomialen Infektionen seit jeher zu den wichtigsten. Bis zum Beginn dieses Jahrhunderts wurden diese Infektionen vor allem durch kontagiöse Patienten oder durch Missachtung der elementaren Regeln der Hygiene verursacht. Tuberkulose, Diphtherie, Kindbettfieber und Wundinfektionen waren die grössten Probleme. Mit den Fortschritten der Medizin, insbesondere mit der Einführung der Antibiotika und der Impfungen, hoffte man, die nosokomialen Infektionen beherrschen zu können. Leider ist das aus verschiedenen Gründen nicht gelungen.

Der Fortschritt der Medizin und die Infektionen

Die heutigen nosokomialen Probleme stehen mit folgenden Fortschritten in Diagnostik und Therapie in Zusammenhang: Betreuung polymorbider Patienten, vermehrte invasive Eingriffe, komplexere Technologien, Implantation provisorischer oder permanenter prothetischer Materialien, Entwicklung der Chemotherapie und antibiotischen Behandlung, Organtransplantationen mit nachfolgender Immunsuppression, neue oder neu entdeckte pathogene Keime, Resistenzentwicklung gegen Antibiotika (Tabelle 1). Deshalb wurde

Tabelle 1: Medizinischer Fortschritt und nosokomiale Infektionen

- Ueberalterung der Bevölkerung
- Verlängertes Ueberleben von Patienten mit chronischen Krankheiten
- Häufung von invasiven diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
- Implantation von prothetischem Material
- Intensive Chemotherapie
- Organtransplantationen, Immunsuppression
- Geistesiger Gebrauch und Missbrauch von Antibiotika

die Prävention, die Diagnose und die Behandlung nosokomialer Infektionen in den letzten 20 Jahren immer komplexer und schwieriger. Obwohl diese Infektionen hauptsächlich bei stationär behandelten Patienten auftreten, ist auch die ambulante Medizin betroffen. Die ambulante Nachbehandlung von Patienten mit nosokomialen Infekten wird immer komplizierter. Und, Ironie des Schicksals, einige Infektionen, die man beherrscht zu haben glaubte, wie die Tuberkulose oder Infektionen verursacht durch Staphylokokken, Pneumokokken oder Enterokokken, werden durch das Auftreten von multiresistenten Stämmen erneut zum Problem. Diese Multiresistenzen sind häufig auf die unkritische Verwendung von Antibiotika zurückzuführen. Auch die HIV-Infektion mit ihren multiplen infektiösen Komplikationen hat neue Risiken für das medizinische Personal und die Patienten mit sich gebracht.

Alle sind betroffen

Die nosokomialen Infektionen führen zu Konsequenzen für das gesamte Gesundheitssystem, sei es aus Gründen der Morbidität, der Mortalität, der Kosten oder der juristischen Aspekte (Abb. 1). Die Aerzte und das Pflegepersonal sind am direktesten betroffen; einerseits durch den unmittelbaren Kontakt zum Patienten, andererseits dadurch, dass ihre Aktivitäten nosokomiale Infektionen hervorrufen oder verhindern können. Dieses gilt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass, für alle medizinischen und chirurgischen Fachgebiete. In einem Spital spielen auch andere Berufe und Dienstleistungsbetriebe eine direkte Rolle in der Prävention: das mikrobiologische Labor, die Sterilisation, der technische Dienst (Ventilation, Wasser), die Küche, der Hausdienst, die Wäscherei, der Personalärztliche Dienst und die Abteilungen für Spitalhygiene. Aber auch die Industrie ist betroffen, denn von jedem Produkt oder Instrument wird eine maximale Sicherheit verlangt. Einige aktuelle Beispiele zeigen die dramatischen Konsequenzen bestimmter Infektionen: Kontamination von Blutprodukten

Editorial

Swiss-NOSO: Noch eine neue medizinische Zeitschrift? Ja, aber eine Zeitschrift mit einem ganz bestimmten Ziel. Dem Ziel, eine Lücke in der Schweiz zu schliessen, indem Aerzte, Pflegepersonal und andere im Gesundheitswesen Tätige regelmässig über die nosokomialen Infektionen und deren Prävention informiert werden sollen.

Die sogenannten nosokomialen Infektionen (aus dem Griechischen noso: die Krankheit; komeion: pflegen), sind Infektionen, die im Rahmen medizinischer Aktivitäten hervorgerufen werden, unabhängig davon ob diese Infektionen im Rahmen stationärer oder ambulanter Abklärungen oder Therapien eintreten. Diese Infektionen können sowohl Patienten wie medizinisches und paramedizinisches Personal, aber auch Besucher betreffen. Nosokomiale Infektionen sind häufig. Man schätzt, dass 5 bis 10 % aller hospitalisierten Patienten nosokomiale Infektionen entwickeln werden. Auf den Intensivstationen sind es sogar gegen 30 %. Diese Infektionen verursachen eine bedeutende Morbidität und Mortalität, aber auch eine deutliche Erhöhung der Gesundheitskosten.

Dieses Bulletin soll präzise, praktische und aktuelle Informationen über Komplikationen nosokomialer Infektionen vermitteln. Die erscheinenden Artikel sollen nicht nur Zusammenfassungen neuester Erkenntnisse sein, sondern auch konkrete Empfehlungen vermitteln, auch wenn die aktuellen wissenschaftlichen Daten nicht immer definitive Schlussfolgerungen zulassen. Zu bestimmten Themen werden praxisbezogene "Technische Hinweise" publiziert. In einer Rubrik "Leserbriefe" soll eine Plattform des Gedankenaustausches für Kommentare und Fragen der Leserschaft geschaffen werden. Zusätzlich werden in einer Literaturübersicht wichtige und aktuelle Artikel kurz zusammengefasst und kommentiert.

Diese Publikation wird durch das Schweizerische Bundesamt für Gesundheitswesen unterstützt. Sie wird dreimonatlich dem BAG-Bulletin beigelegt und gleichzeitig durch die Schweizerische Gesellschaft für Spitalhygiene verteilt. Selbstverständlich können auch andere Organisationen oder Berufsverbände, die an diesen Problemen interessiert sind, eine weitere Verteilung übernehmen.

Die Redaktionskommission

Weitere Artikel:

- Nosokomiale Pneumonie 5
- Plasmasterilisation 7

mit HIV, von vorfabrizierten Infusionen mit gramnegativen Keimen und Infektionen, die auf ungenügende Desinfektion von Endoskopen zurückzuführen sind. Die Spitaladministration und bei nosokomialen Infektionen von gesundheitspolitischer Relevanz auch staatliche Institutionen inter-

Figure 1: Nosokomiale Infektionen: Involviertes Umfeld

essieren sich je länger je mehr für diese Probleme: Die Qualität der Pflege, die Kosten verursacht durch nosokomiale Infektionen aber auch durch präventive Massnahmen werden vermehrt zum Teil auch öffentlich diskutiert. Versicherungen und Staat sind mit zusätzlichen Kosten durch nosokomiale Infektionen konfrontiert und an einer Verminderung derselben interessiert. Ebenso können juristische Instanzen im Fall von Kunstfehlern involviert werden.

Häufigkeit

In den industrialisierten Ländern und insbesondere in der Schweiz rechnet man aufgrund verschiedener Studien mit 4 bis 10 nosokomialen Infektionen pro 100 Spitaleintritte. Viele Faktoren, insbesondere die Art der medizinischen Abteilung oder des Patientenguts haben einen Einfluss auf diese Häufigkeit. Die Intensivpflegestationen weisen die grösste Häufigkeit an nosokomialen Infektionen auf. In einer multizentrischen europäischen Studie, die 1992 in 1'472 Intensivpflegestationen und mit über 10'000 Patienten durchgeführt wurde, stellte man eine Prävalenz der nosokomialen Infektionen von 21 % fest (EPIC-Studie). In den schweizerischen Intensivstationen lag die Prävalenz bei 10 %. Die Häufigkeit einiger Spitalinfektionen ist im Steigen begriffen. Insbesondere die Inzidenz der Bakteriämien hat sich zwischen 1980 und 1989 praktisch verdoppelt, dies sowohl in den grossen Universitätskspitalern als auch in kleineren Spitalern. Gewisse selten gewordene Infektionen werden, wie oben beschrieben, aufgrund des medizinischen Fortschrittes wieder häufiger diagnostiziert. Andererseits werden etablierte Präventionsrichtlinien häufig nicht eingehalten.

Endemie und Epidemie

Mittels neuer Techniken der molekularen Typisierung von Mikroorganismen konnte nachgewiesen werden, dass gewisse Infektionen, die man als "sporadisch oder endogen" beurteilt hatte, in Wirklichkeit von einem Patienten auf den nächsten übertragen worden waren. Mit diesen Methoden gelang es auch, "Clusters" oder Epidemien festzustellen, die im klinischen Alltag verpasst worden waren. So wurden Mängel im Bereiche der klassischen Prävention aufgezeigt. Typische Beispiele dafür sind die multiresistenten Staphylokokken, Clostridium difficile und die Tuberkulose.

Im Falle einer Epidemie wird eine Infektionslokalisierung oder ein bestimmter Keim vorherrschend. Im allgemeinen machen epidemische Infektionen in Spitalern nur einen kleinen Prozentsatz der Infektionen aus (2-4 %). Aber es ist wichtig, sie zu identifizieren, da schnell gezielte Massnahmen zu treffen sind. Gewisse Epidemien sind einfach zu erkennen, während andere nur eine kleine Anzahl von Fällen verteilt über mehrere Monate und eventuell über mehrere Abteilungen oder Spitäler beinhalten. Letztere können lange Zeit unerkannt bleiben, insbesondere wenn ein eigentliches Ueberwachungssystem fehlt. Die Quellen dieser Epidemien und der dafür verantwortlichen Mikroorganismen sind sehr unterschiedlich, und sie können auf allen Abteilungen eines Spitals lokalisiert sein. Die Tabelle 2 zeigt einige kürzlich erkannte Epidemien und deren Ursprung, dem häufig überraschende Situationen zugrunde liegen.

Wichtigste Spitalinfektionen

Je nach Abteilung und Spital variiert die Verteilung der wichtigsten Infektionen. Die häufigsten Infektionen sind Harnwegsinfekte (20 bis 40 %), respiratorische Infekte (10 bis 30 %), postchirurgischen Wundin-

fekte (0 bis 40 %) und Bakteriämien (5 bis 20 %) (Tabelle 3). Für jede der genannten Infektionen kommen ätiologisch eine grosse Anzahl verschiedener Keime und pathophysiologischer Situationen in Frage. Deshalb sind die präventiven Massnahmen unterschiedlich. Als Beispiel seien die verschiedenen Formen der Pneumonie erwähnt (vgl. entsprechenden Artikel auf Seite 5).

Nosokomiale Infektionen in der ambulanten Praxis

Die grösste Anzahl der Arzt/Patientenkontakte findet im ambulanten Bereich statt. Ca. 70 % der Bevölkerung konsultiert innerhalb eines Jahres einen Arzt in seiner Praxis, während weniger als 10 % hospitalisiert werden. Das Risiko, eine Infektion im Rahmen einer ambulanten medizinischen Betreuung zu erwerben, wurde nicht gründlich untersucht, ist aber wahrscheinlich klein. Allerdings wurde in mehreren Publikationen gezeigt, dass auch dieses Risiko besteht und dass entsprechende Infektionen epidemisch werden und sehr schwer verlaufen können (Tabelle 4). Zudem werden auch in der ambulanten Praxis immer mehr invasive Methoden eingesetzt und vermehrt polymorbide Patienten behandelt. Auch hier ist das Infektionsrisiko abhängig von der Art des Patientenguts und der medizinischen Aktivität des Arztes. Ähnlich wie im Spital sind im ambulanten Bereich sowohl die Patienten als auch das medizinische und paramedizinische Personal betroffen, da alle eine Infektion verbreiten oder aquirieren können.

Morbidität, Mortalität

Die Konsequenzen einer im Spital erworbenen Infektion sind vor allem vom Zustand des Patienten und vom Ort der Infektion abhängig (Tabelle 3). Die Harnwegsinfekte verlaufen meistens gutar-

Tabelle 3: Nosokomiale Infektionen: Verteilung und Konsequenzen

	Anteil an Gesamtzahl der Infektionen [%]	Todesfälle infolge Infektion [%]	Mittlere Verlängerung des Spitalaufenthaltes [Tage]
Harnwegsinfektionen	40	<1	1.0
Wundinfektionen	20	2-5	7.3
Pneumonien	15	5-20	5.9
Bakteriämien	5-10	10-40	7.4
Anderer	20		4.8
Total	100	1-10	4.0

tig, während Pneumonien und Bakteriämien mit einer bedeutenden Morbidität und Mortalität assoziiert sind. Die Prognose ist je nach Grundleiden des Patienten verschieden. In den USA geht man davon aus, dass 0,9 % der Todesfälle im Spital durch eine nosokomiale Infektion unmittelbar bedingt sind. Zusätzlich spielen nosokomiale Infektionen bei 2,7 % der Todesfälle eine Rolle. Im Falle der Bakteriämien und Pneumonien beträgt die auf die Infektion zurückzuführende Mortalität je nach Studie 5 bis 40 %.

Kosten der Infektion

Nosokomiale Infektionen verlängern die Hospitalisationsdauer um durchschnittlich 4 Tage und führen häufig zu zusätzlichen, zum Teil mit Risiken verbundenen, diagnostischen und therapeutischen Massnahmen. Sie steigern deshalb die Gesundheitskosten und führen auch zu sozialen Kosten, welche auf Todesfälle und Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen sind. Die genauen Kosten sind schwierig zu beziffern. Sie unterscheiden sich je nach Typ der Infektion. Eine banale Harnwegsinfektion nach Dauerkatheter kostet beispielsweise knapp Sfr 100.- (Urinuntersuchungen und antibiotische Behandlung). Wenn hingegen eine Infektion wie eine Bakteriämie zu einem septischen Schock führt und einen Aufenthalt auf der Intensivpflegestation nötig macht, steigen die Kosten um tausende bis zehntausende von Franken. In

Tabelle 4: Beispiele nosokomialer Infektionen in der ambulanten Praxis

Umstände	Pathogene und Infektionen
Kleingriffe, Punktionen, Injektionen	Wundinfektionen, Arthritis, Abszess
Endoskopie:	Hepatitis B, (Hepatitis C, HIV)?, Endokarditis*
• Obere Luftwege	Mykobakterien, Pseudomonas
• Gastrointestinaltrakt	Salmonellen, Pseudomonas, Helicobacter, C. difficile
• Untere Hamwege	Enterobakterien, Enterokokken
Kontaminiertes Material zum Mehrfachgebrauch:	Lokale oder generalisierte Infektionen mit verschiedenen Mikroorganismen
• Anästhetika, Impfstoffe, Tuberkulin	Hepatitis B und C, HIV
• Nadeln, Instrumente	Infektionen im Bereich des venösen Zugangs, Septikämien
Ambulante intravenöse Behandlungen	Hepatitis B, HIV, Herpes simplex
ORL- oder zahnärztliche Untersuchungen	Hepatitis B und C, HIV
Verletzungen durch mit Blut kontaminierte Gegenstände	Tuberkulose, virale Erkrankungen der Atemwege, Grippe, Varizellen, Masern, Röteln, usw.
Tropfeninfektionen über Atemwege	

* Patient mit kardialen Risikofaktoren

den Vereinigten Staaten wird mit ca. 10 Mia. Dollar Kosten für im Spital erworbene Infektionen gerechnet. In der Schweiz betragen sie jährlich schätzungsweise mehrere 100 Mio. Franken. Diese Kosten müssen gegen die Kosten prophylaktischer Massnahmen abgewogen werden (Abbildung 2). Einige dieser Massnahmen allgemeiner Art gehören zur sogenannten "good clinical practice" jeder medizinischen Handlung. Andere Massnahmen müssen von kompetenten Spezialisten geleitet werden. Mehrere Studien weisen die medizinische und ökonomische Wirksamkeit der Gesamtheit dieser Massnahmen nach.

Juristische Aspekte

In gewissen Ländern sind juristische Konsequenzen iatrogenen Komplikationen sehr gefürchtet. Nur wenige Aerzte haben in den Vereinigten Staaten nach mehreren Jahren Praxis nicht mehrfach prozessieren müssen. Das zwingt sie, Haftpflichtversicherungen mit teilweise astronomischen Prämien abzuschliessen (über 100'000 \$ pro Jahr), welche indirekt die Gesundheitskosten weiter erhöhen. Französische Statistiken zeigen, dass ungefähr 10 % der Gerichtsfälle zwischen Aerzten und Patienten bzw. Versicherungen durch infektiöse Komplikationen hervorgerufen werden. Auch in der Schweiz steigt die Anzahl der juristischen Expertisen der FMH von Jahr zu Jahr. In einigen Spitalern in der Schweiz, musste ein Teil der durch Spitalerpidemien verursachten Kosten vom Spital übernommen werden.

Prävention: Eine multidisziplinäre Angelegenheit

Die Prävention nosokomialer Infektionen involviert viele Sektoren des Spitals und der ambulanten Praxis. Sie basiert auf dem Verständnis der Uebertragungswege und der prädisponierenden Faktoren nosokomialer Infekte (vgl. Abbildung 3). Die Prävention hat zwei Ziele: Erstens soll verhindert werden, dass sich ein Patient mit seiner endogenen Flora infiziert, d. h. dass es nicht zu einer Infektion mit Mikroorganismen kommt, mit denen er schon vor seiner Spitalaufnahme kolonisiert war. Sol-

che "Autoinfektionen" können z. B. im Rahmen eines invasiven Eingriffs entstehen. Zweitens gilt es zu vermeiden, dass sich der Patient mit exogenen Mikroorganismen kolonisiert oder sogar infiziert (übertragene Infektion). Unter letzteren findet man insbesondere die multiresistenten Bakterien, des Hepatitis B und Hepatitis C Virus sowie das HIV.

Figure 2: Der Kostenvergleich

Die Prinzipien der Prävention sind zwar einfach aufzustellen, sind aber aus zwei Gründen sehr schwierig in die Praxis umzusetzen. Erstens existiert grosse Unsicherheit über die Effizienz und das Kosten-Nutzen Verhältnis gewisser Massnahmen. Soll beispielsweise ein Träger eines multiresistenten Staphylokokkus aureus vollständig isoliert werden? Soll er antibiotisch behandelt werden? Sollen bei Aerzten und Pflegepersonal sowie bei den anderen Patienten der Abteilung Abstriche gemacht werden?... Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine präzisen Antworten auf viele wichtige Fragen. Zweitens ist es schwierig, effiziente Massnahmen zu überwachen. Obwohl beispielsweise mehrfach gezeigt worden ist, wie wirksam das Händewaschen zwischen zwei Patientenkontakten ist, wird diese einfache Massnahme häufig vernachlässigt.

Infektionen und Personal

Das medizinische und paramedizinische Personal war seit jeher dem Risiko ausgesetzt, Infektionskrankheiten zu übertragen aber auch zu aquirieren. Am Anfang unseres Jahrhunderts betrug des Risiko, im Laufe von 20 Jahren eine Tuberkulose zu erwerben für das medizinische Personal ca. 30 %. Vor der Einführung der Hepatitis B-

die in der akuten Krankheitsphase nicht zu verwerten. Es empfiehlt sich deshalb, nicht sogenannten "breite" serologische Untersuchungen zu verordnen, sondern je eine Serumprobe aus der akuten bzw. der Rekonvaleszenzphase einzufrieren. Diese Proben können dann bei Bedarf gezielt auf bestimmte Antikörper untersucht werden. Es muss jedoch betont werden, dass der Wert dieser Untersuchung einerseits in der Unterstützung epidemiologischer Abklärungen andererseits im durch präzisere Diagnostik erzielten Lerneffekt liegt.

Trotz der breiten Palette diagnostischer Möglichkeiten gelingt es bei vielen intubierten Patienten, bei denen die Diagnose einer Pneumonie bei Vorliegen der vier oben erwähnten Kriterien erwohnen wird, nicht, eine ätiologisch präzise Diagnose zu stellen. Die mangelnde Spezifität der verwendeten Kriterien führt einerseits dazu, dass die Diagnose in gewissen Situationen zu häufig, in anderen zu selten gestellt wird. So wird bei Patienten mit ARDS die Diagnose eher zu selten, bei Patienten mit anderen Ursachen respiratorischer Insuffizienz eher zu häufig gestellt. Andererseits gelingt trotz Einsatzes invasiver Methoden nur bei ca. einem Drittel der Fälle eine präzise Diagnose. Die häufigsten invasiven Methoden werden nachstehend beschrieben.

Techniken zur invasiven Pneumoniadiagnostik

Diese Methoden sind einerseits die bronchoalveoläre Lavage (BAL) oder die endobronchiale Aspiration von Sekret durch einen geschützten Katheter (protected specimen brush, PSB). Beide Methoden ermöglichen die gezielte und semiquantitative mikrobiologische Untersuchung von Sekret oder Lavageflüssigkeit. Bei einer Kolonienzahl von $>10^7$ /ml (PSB) beziehungsweise $>10^6$ /ml (BAL) ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Pneumonie sehr hoch. Zahlreiche tiereperimentelle Untersuchungen sowie klinische Studien unterstützen den Nutzen dieser Methoden, der jedoch durch vorausgehende Antibiotikatherapie stark eingeschränkt wird. Die Sensitivität von BAL oder PSB für die Diagnose der Pneumonie beträgt ca. 90 % (Variation zwischen 60 und 95 % je nach Studie) und

die Spezifität zwischen 80 und 100 %. Trotz des guten positiven prädiktiven Wertes dieser Methoden bleibt die Rate der falsch-negativen Resultate immer noch zwischen 10 und 30 %.

Sowohl BAL als auch PSB erfordern die Durchführung einer Bronchoskopie. Diese Untersuchung ist nicht risikolos und setzt die Verfügbarkeit eines Pneumologen voraus. In den letzten Jahren wurden Methoden zur "blinden" BAL entwickelt, die beim intubierten Patienten ohne Bronchoskopie eine Probenentnahme ermöglichen. Da die anatomische Lokalisation des eingeführten Katheters in der Regel nicht verifiziert wird, kann das gewonnene Sekret nur bei bilateraler Pneumonie als repräsentativ beurteilt werden. Neben den invasiven Methoden der PSB und der BAL dürfte die quantitative mikrobiologische Untersuchung von Trachealsekret in der Praxis einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Die Gewinnung von Trachealsekret durch Absaugen ist nicht invasiv und die quantitative Untersuchung weist eine Sensitivität von 70 % und eine Spezifität von 72 % auf. Obwohl die Spezifität geringer ist als diejenige von BAL oder PSB, sprechen geringere Invasivität und leichte Verfügbarkeit für diese Methode.

Wann sind invasive diagnostische Massnahmen indiziert?

BAL oder PSB sollten nicht als Routine-massnahmen bei allen Patienten mit Verdacht auf nosokomiale Pneumonie durchgeführt werden sondern gezielt zur Abklärung unklarer pulmonaler Befunde insbesondere bei immunsupprimierten Patienten. Bei diesen Patienten ist, wie oben erwähnt, das differentialdiagnostische Spektrum breiter und umfasst neben den üblichen gramnegativen und grampositiven Bakterien zusätzlich Viren, Pilze oder Parasiten. Auch bei Patienten mit trotz antibiotischer Therapie progredienter pulmonaler Erkrankung sind die oben erwähnten invasiven Untersuchungen indiziert. In der täglichen Praxis wird dies vorwiegend für auf Intensivstationen hospitalisierte Patienten zutreffen, deren Diagnose unklar und der Verlauf unbefriedigend ist. Eine auf diesem Weg gewonnene Kultur und das entsprechende Antibiogramm erlauben an-

schliessend eine gezielte Therapie. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass eine negative Untersuchung mittels BAL oder PSB nicht a priori eine Pneumonie ausschliesst. Die Entscheidung, eine Antibiotikatherapie zu beginnen oder fortzusetzen, erfordert deshalb nach wie vor und primär die klinische Beurteilung der Situation. In Tabelle 2 sind die Vor- und Nachteile der erwähnten diagnostischen Methoden zusammengefasst.

Unsere Ausführungen zur Diagnose der nosokomialen Pneumonie sollen deutlich machen, dass diese Infektion im Spital und insbesondere auf Intensivstationen eine wichtige Komplikation mit hoher Morbidität und Mortalität darstellt. Trotz den hier zusammengefassten Fortschritten in der Diagnostik dank Verwendung neuer Techniken bleibt die präzise, insbesondere die ätiologische Diagnose der nosokomialen Pneumonie schwierig und stellt eine grosse Herausforderung an die Kliniker dar.

Literatur

- PITTE D. *Pneumonie nosocomiale: incidence, morbidité et mortalité chez le patient intubé-ventilé*. Schweiz Med Wochenschr. 1994;124: 227-235.
Arbeit, die die Risikofaktoren für die Pneumonieentstehung beim intubierten Patienten darstellt.
- FAGON JY, CHASTRE J, HANCE AJ, et al. *Detection of nosocomial lung infection in ventilated patients. Use of a protected specimen brush and quantitative culture techniques in 147 patients*. Am Rev Respir Dis. 1988; 138: 110-116.
Beschreibung der quantitativen Aufarbeitung und der Interpretation von Bronchialsekret nach PSB.
- EL-EIARY M, TORRES A, GONZÁLEZ J, et al. *Quantitative cultures of endotracheal aspirates for the diagnosis of ventilator-associated pneumonia*. Am Rev Respir Dis. 1993; 148: 1552-1557.
Vergleich von invasiver Diagnostik (PSB, BAL) mit der nicht invasiven quantitativen Untersuchung von Trachealsekret.

Tabelle 2: Methoden zur Diagnose der nosokomialen Pneumonie

Methode	Vorteile	Nachteile	Beurteilung
Sputum	<ul style="list-style-type: none"> nicht invasiv auch beim nicht intubierten Patienten verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> ungenügende Spezifität Sensitivität nicht bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> in der Regel nicht verwertbar
Endotracheale Aspiration (quantitative Untersuchung)	<ul style="list-style-type: none"> nicht invasiv beim intubierten Patienten leicht zu erhalten 	<ul style="list-style-type: none"> nur quantitative Kultur mit genügender Spezifität Stellenwert beim nicht-intubierten Patienten unbekannt 	<ul style="list-style-type: none"> unter Einbezug der quantitativen Mikrobiologie neuere Methode; in weiteren Studien zu evaluieren
protected specimen brush (PSB), bronchoalveoläre Lavage* (BAL)	<ul style="list-style-type: none"> gute Sensitivität und Spezifität (ausser bei vorgängiger Antibiotikatherapie) 	<ul style="list-style-type: none"> invasiv Erfordert besondere Bronchoskopieausrüstung Komplikationen 	<ul style="list-style-type: none"> nicht in allen Spitalern jederzeit verfügbar Sensitivität bei antibiotischer Vorbehandlung ungenügend

* Die BAL gilt als Methode der Wahl bei immunsupprimierten Patienten mit pulmonalem Infiltrat oder unerklärter Erniedrigung der arteriellen Sauerstoffsättigung.

Plasmasterilisation: eine revolutionäre Technik für thermolabile Instrumente

Andreas F. Widmer, Basel, Hans Siegrist, La Chaux-de-Fonds

Die moderne Medizin benötigt zunehmend komplex aufgebaute, teure Instrumente, die wegen ihrer Thermolabilität nicht mit Dampfsterilisatoren aufbereitet werden können. Für derartige Instrumente kam meist nur die Ethylenoxidsterilisation in Frage. Dieser Prozess dauert ca. 2 Stunden, gefolgt von einer 8-10-stündigen Belüftungsphase, um toxische Rückstände am Material zu eliminieren.

Mit einer neuen Technik, der Plasmasterilisation, können nun auch hochlabile elektronische Instrumente innert 75 Minuten sterilisiert und anschliessend sofort wieder verwendet werden. Das Prinzip der Sterilisation basiert auf der Bildung von hochreaktiven Hydroxy- und Hydroxylradikalen aus Wasserstoffperoxid, die durch Verbindung an essentielle Zellbausteine der Mikroorganismen diese abtöten. Der Sterilisationsprozess läuft in 5 Phasen bei einer Kammertemperatur von 45°C ab.

- Sterilisation auch von hochempfindlichen elektronischen Teilen möglich (keine Korrosionsgefahr)
- Keine toxischen Rückstände
- Geringe Installationskosten

Die Umlaufzeit für die Aufbereitung hochempfindlicher und meist teurer Instrumente ist sehr kurz, so dass diese Instrumente am gleichen Tag mehrmals verwendet werden können, was mit der Ethylenoxid-Sterilisation nicht möglich war. Die Bedienung des Sterilisators ist einfach, der Prozess computergesteuert und mikroprozessor-kontrolliert. Falls der Wasserstoffperoxid-Dampf nicht überall diffundieren kann, oder absorbiert wird, wird der Sterilisationsvorgang automatisch unterbrochen.

Nachteile

Auf die Nachteile dieses neuartigen Verfahrens soll ganz speziell eingegangen werden: Wasserstoffperoxid-Dampf wird von zellulosehaltigen Materialien stark adsorbiert. Daher kann die Plasmasterilisation nicht für zellulosehaltiges Sterilisationsgut oder derart verpackte Instrumente eingesetzt werden. Alle Verpackungsmaterialien müssen zellulosefrei sein und sind zur Zeit nur von der Betreiberfirma erhältlich. Zudem sind z.B. Verpackungsbeutel im Durchschnitt 3x teurer als vergleichbare Produkte für die Dampfsterilisation. Behälter für Instrumente wie sie für die Dampfsterilisation zur Verfügung stehen, sind erst in Entwicklung. Die Instrumente müssen vor Beschädigung des Plasmasterilisators vollständig trocken sein. Bei organischer Verschmutzung der Oberfläche ist die Wirkung der Plasmasterilisation erheblich eingeschränkt, wie dies allerdings bei allen Oberflächensterilisationsverfahren der Fall ist.

Das Sterilisationsverfahren

Nach Absenken des Innendruckes auf 0,4 mbar (Vakuumphase, Phase I) wird 58 % Wasserstoffperoxid aus einer Kassette verdampft (Injektionsphase, Phase II). Das Wasserstoffperoxid verteilt sich während der Diffusionsphase (Phase III) auf das Sterilisationsgut.

Im Vakuum wird nun mittels Hochfrequenz im MHz-Bereich der Wasserstoffperoxid-Dampf in die Plasmaphase überführt (Phase IV). Nach Belüftung (Phase V) kann das Sterilgut entnommen werden. Verbliebenes Wasserstoffperoxid zerfällt in Sauerstoff und Wasser. Toxische Wirkstoffrückstände sind daher, im Gegensatz zu Ethylenoxid oder Formaldehyd, nicht zu erwarten.

Dieses Verfahren wurde von der Firma Johnson & Johnson entwickelt und patentiert. Kommerziell ist zur Zeit nur ein Gerätetyp erhältlich: Der Sterrad® 100 NTP. Die Sterilisationskammer besteht aus 2 Regalen mit 30 und 40 l Kapazität. Die Aussenmasse betragen 167x100x74 cm. Das Gerät benötigt Standardelektroanschlüsse. Im Oktober 1993 wurde das Produkt von der Food and Drug Administration (FDA) in den USA für das Marketing freigegeben. Die für die Sterilisation im europäischen Raum geforderte Reduktion von 6 log einer Sporensuspension wird bei sauberen Instrumenten, die mit dem Wasserstoffperoxid in Kontakt kommen, ebenfalls erreicht.

Vorteile

- Rasche Sterilisationszeit (75 Minuten)
- Tiefe Kammertemperatur (45°C) während der Sterilisation

Auf die Nachteile dieses neuartigen Verfahrens soll ganz speziell eingegangen werden: Wasserstoffperoxid-Dampf wird von zellulosehaltigen Materialien stark adsorbiert. Daher kann die Plasmasterilisation nicht für zellulosehaltiges Sterilisationsgut oder derart verpackte Instrumente eingesetzt werden. Alle Verpackungsmaterialien müssen zellulosefrei sein und sind zur Zeit nur von der Betreiberfirma erhältlich. Zudem sind z.B. Verpackungsbeutel im Durchschnitt 3x teurer als vergleichbare Produkte für die Dampfsterilisation. Behälter für Instrumente wie sie für die Dampfsterilisation zur Verfügung stehen, sind erst in Entwicklung. Die Instrumente müssen vor Beschädigung des Plasmasterilisators vollständig trocken sein. Bei organischer Verschmutzung der Oberfläche ist die Wirkung der Plasmasterilisation erheblich eingeschränkt, wie dies allerdings bei allen Oberflächensterilisationsverfahren der Fall ist.

Aktuelle Probleme

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat zudem noch einige Vorbe-

I Vakuumphase
II Injektionsphase
III Diffusionsphase
IV Plasmaphase
V Belüftungsphase

halte gegen die Plasmasterilisation publiziert:

Die Sterilisation von langen, englumigen Kanälen, wie z.B. bei Endoskopen, ist noch nicht vollständig gelöst. Mittels sog. Diffusionsverstärker wird versucht, genügend Wasserstoffperoxid-Dampf in diese Kanäle einzubringen. Die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens wird von der Gesellschaft bezweifelt. Die Qualitätskontrolle dieses Sterilisationsverfahrens ist noch nicht weltweit standardisiert. Zur Zeit wird als Bioindikator meist Bacillus subtilis verwendet, wobei die Evaluation der hochresistenten Sporen (z.B. B. stearothermophilus) gegen dieses Sterilisationsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der chemische Behandlungssindikator soll auch unter Lichteinfluss umschlagen und daher nicht einen zuverlässigen Indikator für die korrekte Sterilisation darstellen. Bei Anwendung nach den Richtlinien der Hersteller (lichtgeschützte Verpackung) sollte diese Fehlinterpretation jedoch vermeidbar sein.

Zusammenfassend ist die Plasmasterilisation ein entscheidender Fortschritt, der die Aufbereitung hochempfindlicher, thermolabiler Instrumente innert kurzer Zeit ermöglicht. Langfristig wird dieses Verfahren die Ethylenoxidsterilisation zum grossen Teil ersetzen. Im Kantonsspital Basel ist eine derartige Gerät für thermolabile Instrumente seit 6 Monaten erfolgreich im Einsatz. Instrumente mit Lumina unter 0,3 cm und über 30 cm Länge werden damit noch nicht sterilisiert, solange nicht genügend Daten über die Sicherheit publiziert sind.

Literatur

- MECKE P. *Wasserstoffperoxid-Plasma — ein interessantes mikrobizides Prinzip*. Hyg. Med. 1992; 17: 537-42.
Übersicht über das Prinzip der Plasmasterilisation.
- BORNESS M, FÄRBER U, GETREUER H et al. *Zur Wirksamkeit und Prüfung von H₂O₂-Plasma-Sterilisatoren*. Hyg. Med. 1993; 18: 557-8.
Kritische Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.
- HÖLLER C, MARTIN H, CHRISTIANSEN B et al. *The efficacy of low temperature plasma (LTP) sterilization, a new sterilization technique*. Zbl. Hyg. 1993; 194: 380-91.
Sehr gute mikrobiologische Testung des Produktes. Publierte Ergebnisse von Untersuchungen aus den USA fehlen

Eine Medizinalperson verletzt sich mit einer Nadel, die mit Blut eines Patienten mit bekannter Hepatitis C kontaminiert ist. Wie gross ist das Infektionsrisiko? Welche Massnahmen sind zu treffen?

A. S., Nyon

Sollten Medizinalpersonen, die bei der Pflege und Behandlung eines Patienten mit Meningokokkenmeningitis beteiligt waren, eine Antibiotikaprophylaxe durchführen?

R. W., Basel

Interessante Artikel

Decrease in nosocomial *Clostridium difficile*-associated diarrhea by restricting clindamycin use.

PEAR SM et al.: Ann. Int. Med. 1994; 120:272-277.

In diesem Artikel wird eine *Clostridium difficile*-Epidemie in einem amerikanischen Spital beschrieben. Während der 13monatigen Beobachtungszeit wurde eine durchschnittliche monatliche Inzidenz von 7,7 Fällen registriert. Diese hatte im Gegensatz dazu während der 33 vorausgegangenen Monate 1,5 Fälle betragen. In 59 % der Fälle wurde derselbe Clindamycinresistente Stamm isoliert. Mit den klassischen Hygienemassnahmen konnte diese Epidemie nicht unter Kontrolle gebracht werden. Der Gebrauch von Clindamycin war deutlich mit dieser Epidemie assoziiert: Die Verschreibung von Clindamycin war vor der Epidemie um 41 % gestiegen und war deutlich höher als in anderen vergleichbaren Spitälern. Mit Clindamycin behandelte Patienten hatten ein um das 3 bis 9fache erhöhtes Risiko an einer *Clostridium difficile* Infektion zu erkranken. Nachdem der Gebrauch von Clindamycin um 83 % gesenkt worden war, konnte die Epidemie unter Kontrolle gebracht und der beschriebene vorherrschende Stamm eliminiert werden. Die Untersuchung dieser Epidemie zeigt, dass die mikrobiologischen Daten mit den lokalen Therapiegewohnheiten korreliert werden müssen und dass eine

Das Risiko für das Auftreten einer Hepatitis C-Infektion nach Verletzung mit einer Nadel, die mit Blut eines infizierten Patienten kontaminiert ist, ist wahrscheinlich kleiner als 2 %. Genaue Zahlen liegen jedoch nicht vor. Die Reinigung und Desinfektion der Wunde sollte sofort durchgeführt werden. Hingegen liegen zurzeit keine Studien vor, die die Wirksamkeit einer prophylaktischen Gabe von Gammaglobulinen belegen. Auch eine medikamentöse Prophylaxe existiert nicht. Diese Verletzungen sollten als "Bagatelunfall" dem Personalarzt gemeldet werden, der zum Zeitpunkt der Verletzung sowie 3 Monate später eine Blutentnahme für serologische Untersuchungen durchführen sollte. Gleichzeitig sollte vom Personalarzt der Impfstatus bezüglich Hepatitis B überprüft werden und wenn nötig die Impfung wiederholt werden. Die Umstände, die die Verletzung begünstigten, sollten mit den betroffenen Mitarbeitern analysiert werden und entsprechende Vorschläge zur Verhütung zukünftiger Verletzungen diskutiert werden.

Daniel Lavanchy, Immunologie-Allergie, CHUV, Lausanne

Die antibiotische Prophylaxe (in der Regel mit Rifampicin) sollte bei denjenigen Personen durchgeführt werden, die einen nahen Kontakt mit einem Patienten mit Meningokokkenmeningitis hatten. Das Risiko, an einer Meningitis zu erkranken ist für diese Personen 1000-fach höher als für die übrige Bevölkerung. Sekundäre Fälle beim Spitalpersonal kommen extrem selten vor. Deshalb ist eine Prophylaxe nur für Medizinalpersonen sinnvoll, die eine ausgeprägte Exposition gegenüber oropharyngealen Sekreten zum Beispiel im Rahmen von Reanimation, Intubation, endotrachealem Absaugen aufweisen.

Prof. R. Lüthy, Infektionskrankheiten und Spitalhygiene, USZ, Zürich.

Aenderung im Gebrauch von Antibiotika mithelfen kann, eine bestimmte Epidemie unter Kontrolle zu bringen.

Nosocomial outbreak of tuberculosis in a renal transplant unit: application of a new technique for restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of *Mycobacterium tuberculosis* isolates.

JEREB JA et al.: J. Inf. Dis. 1993; 168:1219-1224.

In dieser Arbeit wird eine Miniepidemie mit *Mycobacterium tuberculosis* (TBC) mit 10 Fällen in 13 Monaten in einer Abteilung für Nierentransplantation beschrieben. Der Indexpatient hatte während einer früheren Hospitalisation Kontakt mit einem Tuberkulosekranken gehabt. Wegen Allgemeinsymptomen wurde er in einer Transplantationsabteilung hospitalisiert, wo er die anderen Patienten während einer Expositionszeit von 12 Stunden bis 15 Tagen ansteckte. Bei 9 der 10 Fälle war ein negativer Mantouxtest vor der Hospitalisation dokumentiert worden. Die Verzögerung in der Diagnostik, die fehlende Isolierung des Infizierten, die Belüftungsverhältnisse sowie eine im Krankenzimmer durchgeführte Bronchoskopie hatten zur Verbreitung der Infektion beigetragen. Durch Typisierung der TBC-Stämme mittels PCR/RFLP konnte die nosokomiale Übertragung bewiesen werden. Diese kleine Epidemie unter-

streicht die Wichtigkeit der schnellen Diagnose der Tuberkulose und der strikten Isolierung auf TBC verdächtiger Patienten.

The effect of directly observed therapy on the rates of drug resistance and relapse in tuberculosis

WEIS SE et al.: N. Engl. J. Med. 1994; 330: 1179-1184.

Die Tuberkulose wird wieder zu einem wichtigen Problem des Gesundheitswesens, vor allem auch wegen des Auftretens multi-resistenter Stämme. In dieser Studie wurde das Auftreten resistenter Tuberkulosestämme sowie die Rezidivquote unter tuberkulostatischer Therapie je nach Verabreichungsart der Medikamente untersucht. Unter direkter Supervision der Einnahme der Medikamente waren die Therapieversager und das Auftreten resistenter *M. tuberculosis*-Stämme deutlich geringer als bei der nicht kontrollierten Behandlung. Dies erstaunt nicht, betrifft doch die Tuberkulose heutzutage häufig soziale Randgruppen mit fraglicher Compliance für eine mehrmontatige Behandlung. Es ist wichtig, dass Strukturen geschaffen werden, welche eine Kontrolle der tuberkulostatischen Therapie ermöglichen. □

Swiss - NOSO

Redaktion

Korrespondenzadresse

wird dreimonatlich mit der Unterstützung des Bundesamtes für das Gesundheitswesen (BAG) und der Schweizerischen Gesellschaft für Spitalhygiene (SGSH) veröffentlicht.

Patrick Francioli (Lausanne), Didier Pittet (Genf), Pierre-Alain Raeber (BAG), Christian Ruef (Zürich), Hans Siegrist (SGSH), Jan Von Overbeck (Bern), Andreas F. Widmer (Basel)

Prof. P. Francioli, CHUV, 1011 Lausanne